Bortezomib

Adamed Bortezomib

Przygotowanie roztworu
do wstrzyknięcia podskórnego i dożylnego

Wstrzyknięcie PODSKÓRNE

dodaj

1,4 ml
0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań

0,9% NaCl

uzyskane stężenie roztworu

2,5 mg/ml

Wstrzyknięcie DOŻYLNE

dodaj

0,9% NaCl

3,5 ml
0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań

uzyskane stężenie roztworu

1 mg/ml

Objętość rozpuszczalnika wykorzystywana do przygotowania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i podskórnych różni się. **Z tego względu otrzymane docelowe stężenie roztworu będzie różne.**

Ponieważ BORTEZOMIB ADAMED jest produktem cytotoksycznym podczas obchodzenia się z lekiem i przygotowania do użycia należy zachować ostrożność.
By chronić się przed kontaktem leku ze skórą zaleca się stosowanie rękawiczek i innego rodzaju odzieży ochronnej.

Należy sprawdzić stężenie na fiolce by mieć pewność, że zostanie podana właściwa dawka drogą dożylną (1 mg/ml).

Rozpuszczony lek jest pozbawiony konserwantów i powinien zostać zużyty niezwłocznie po przygotowaniu. Jednakże **stabilność chemiczna i fizyczna przygotowanego roztworu zachowana jest do 8 godzin przed podaniem, gdy przechowywany jest w temperaturze 25 °C.**

W celu uniknięcia błędu, **strzykawki do podania dożylnego oraz podskórnego powinny zostać oznaczone w różny sposób.**

Lek przeznaczony jest wyłącznie do wstrzykiwania dożylnego bądź podskórnego. Nie podawać inną drogą.

Wszelkie działania niepożądane lub błędy w stosowaniu leku należy zgłaszać do podmiotu odpowiedzialnego lub Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Urząd Rejestracji PL, WM i PB, Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa.
ndl@urpl.gov.pl

ADAMED

Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Bortezomib Adamed (ChPL).