



DAWKOWANIE LEKU BORTEZOMIB ADAMED
W INDUKCJI PRZED PRZESZCZEPIENIEM SZPIKU

Bortezomib
Adamed Bortezomib 



Bortezomib
Adamed Bortezomib



Produkt leczniczy BORTEZOMIB ADAMED w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w skojarzeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych.

Bortezomib
Adamed Bortezomib

SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON W CYKLACH 1-8

Postępujący szpiczak mnogi

Gdy lek BORTEZOMIB ADAMED jest podawany razem z deksametazonem, pacjent będzie otrzymywał BORTEZOMIB ADAMED dożylnie lub podskórnie podczas 21-dniowego cyklu leczenia, a deksametazon będzie podawany doustnie w dawce 20 mg w dniach 1., 2., 4., 8., 9. i 11. cyklu BORTEZOMIB ADAMED trwającego 21 dni. Pacjent może otrzymać do 8 cykli (24 tygodnie).

SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON W CYKLACH 1-8

DWA RAZY W TYGODNIU,
TRZYTYGODNIOWY CYKL x 8

①	②	3	④	5	6	7
⑧	⑨	10	⑪	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

○ Bortezomib Adamed
□ Deksametazon

SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON W CYKLACH 1-4

Wcześniej nieleczonego szpiczaka mnogiego

Jeśli pacjent nie był wcześniej leczony z powodu szpiczaka mnogiego i pacjent kwalifikuje się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych, będzie otrzymywał lek BORTEZOMIB ADAMED dożylnie lub podskórnie razem z innymi lekami: deksametazonem lub deksametazonem z talidomidem w indukcji leczenia.

W przypadku gdy BORTEZOMIB ADAMED podawany jest z deksametazonem, pacjent otrzyma lek BORTEZOMIB ADAMED dożylnie lub podskórnie w 21-dniowym cyklu, a deksametazon w dawce 40 mg będzie podawany doustnie w dniach 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. w 21-dniowym cyklu leczenia BORTEZOMIB ADAMED. Pacjent otrzyma do 4 cykli (12 tygodni).

SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON W CYKLACH 1-4

DWA RAZY W TYGODNIU,
TRZYTYGODNIOWY CYKL x 4

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

○ Bortezomib Adamed
□ Deksametazon

SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON I TALIDOMID W CYKLACH 1-6

Wcześniej nieleczony szpiczak mnogi

W przypadku gdy BORTEZOMIB ADAMED podawany jest z deksametazonem i talidomidem czas trwania cyklu terapeutycznego wynosi 28 dni (4 tygodnie). Deksametazon w dawce 40 mg będzie podawany doustnie w dniach 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. w 28-dniowym cyklu leczenia BORTEZOMIB ADAMED, a talidomid podaje się doustnie raz na dobę w dawce 50 mg do dnia 14. pierwszego cyklu, a gdy dawka jest tolerowana zwiększa się ją do 100 mg w dniach 15.-28. i może być następnie zwiększona do 200 mg na dobę od drugiego cyklu. Pacjent może otrzymać do 6 cykli (24 tygodnie).

Talidomid nie może być stosowany przez kobiety w ciąży lub przez kobiety, które mogą zajść w ciążę, tylko jeśli spełnione są wszystkie wymagania „Programu Zapobiegania Cięży Thalidomide”. Pacjenci otrzymujący Bortezomib Adamed w skojarzeniu z talidomidem powinni postępować zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu.

SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON I TALIDOMID W CYKLACH 1-6

DWA RAZY W TYGODNIU,
CZTEROTYGODNIOWY CYKL x 6

①	②	③	④	5	6	7
⑧	⑨	⑩	⑪	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

- Bortezomib Adamed
- Deksametazon
- Talidomid:

Cykl 1 - w dawce 50 mg do dnia 14.

W dawce 100 mg w dniach: 15. - 28.

Cykl 2-6 w dawce 200 mg w dniach: 1. - 28.