

DAWKOWANIE LEKU BORTEZOMIB ADAMED 2,5 mg  
W INDUKCJI PRZED PRZESZCZEPIENIEM SZPIKU

2,5 mg

# BORTEZOMIB ADAMED



2,5 mg

# BORTEZOMIB ADAMED



**Produkt leczniczy BORTEZOMIB ADAMED** w skojarzeniu z deksametazonem, lub deksametazonem i talidomidem wskazany jest w indukcji leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem mnogim, którzy kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w skojarzeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych.



## SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON W CYKLACH 1-8

### *Postępujący szpiczak mnogi*

Gdy lek BORTEZOMIB ADAMED jest podawany razem z deksametazonem, pacjent będzie otrzymywał BORTEZOMIB ADAMED w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o mocy 2,5 mg dożylnie lub podskórnie w zalecanej dawce 1,3 mg/m<sup>2</sup> powierzchni ciała dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie w dniach 1., 4., 8. i 11 w 21-dniowym cyklu leczenia, a deksametazon będzie podawany doustnie w dawce 20 mg w dniach 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. i 12. cyklu leczenia BORTEZOMIB ADAMED trwającego 21 dni. Pacjent może otrzymać do 8 cykli (24 tygodnie).

## SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON W CYKLACH 1-8



-  Bortezomib Adamed  
 Deksametazon

## SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON W CYKLACH 1-4

### *Wcześniej nieleczony szpiczak mnogi*

Jeśli pacjent nie był wcześniej leczony z powodu szpiczaka mnogiego i pacjent kwalifikuje się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych, będzie otrzymywał lek BORTEZOMIB ADAMED dożylnie lub podskórnie razem z innymi lekami: deksametazonem lub deksametazonem z talidomidem w indukcji leczenia.

W przypadku gdy BORTEZOMIB ADAMED podawany jest z deksametazonem, pacjent otrzyma lek BORTEZOMIB ADAMED dożylnie lub podskórnie, w zalecanej dawce  $1,3 \text{ mg/m}^2$  powierzchni ciała, dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie w dniach 1., 4., 8. i 11. w 21-dniowym cyklu, a deksametazon w dawce 40 mg będzie podawany doustnie w dniach 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. cyklu leczenia BORTEZOMIB ADAMED. Pacjent otrzyma do 4 cykli (12 tygodni).

## SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON W CYKLACH 1-4

DWA RAZY W TYGODNIU,  
TRZYTYGODNIOWY CYKL x 4

①	②	③	④	5	6	7
⑧	⑨	⑩	⑪	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21

○ Bortezomib Adamed  
□ Deksametazon

## SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON I TALIDOMID W CYKLACH 1-6

### *Wcześniej nieleczony szpiczak mnogi*

W przypadku gdy BORTEZOMIB ADAMED podawany jest z deksametazonem i talidomidem czas trwania cyklu terapeutycznego wynosi 28 dni (4 tygodnie).

BORTEZOMIB ADAMED w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o mocy 2,5 mg będzie podawany w zalecanej dawce  $1,3 \text{ mg/m}^2$  powierzchni ciała, dwa razy w tygodniu przez dwa tygodnie w dniach 1., 4., 8. i 11. w 28 -dniowym cyklu leczenia

Deksametazon w dawce 40 mg będzie podawany doustnie w dniach 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. w 28-dniowym cyklu leczenia BORTEZOMIB ADAMED, a talidomid podaje się



## SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON I TALIDOMID W CYKLACH 1-6

doustnie raz na dobę w dawce 50 mg do dnia 14. pierwszego cyklu, a gdy dawka jest tolerowana zwiększa się ją do 100 mg w dniach 15.-28. i może być następnie zwiększona do 200 mg na dobę od drugiego cyklu. Pacjent może otrzymać do 6 cykli (24 tygodnie).

Talidomid nie może być stosowany przez kobiety w ciąży lub przez kobiety, które mogą zajść w ciążę, chyba, że spełnione są wszystkie wymagania „Programu Zapobiegania Cięży Thalidomide”. Pacjenci otrzymujący Bortezomib Adamed w skojarzeniu z talidomidem powinni postępować zgodnie z zasadami wyżej wymienionego programu.

## SCHEMAT PODANIA LEKU BORTEZOMIB ADAMED + DEKSAMETAZON I TALIDOMID W CYKLACH 1-6

DWA RAZY W TYGODNIU,  
CZTEROTYGODNIOWY CYKL x 6

①	②	③	④	5	6	7
⑧	⑨	⑩	⑪	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

- Bortezomib Adamed
- Deksametazon
- Talidomid:

**Cykl 1** - w dawce 50 mg do dnia 14.

W dawce 100 mg w dniach: 15. - 28.

**Cykl 2-6** w dawce 200 mg w dniach: 1. - 28.

Aby uzyskać więcej informacji należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Bortezomib Adamed (ChPL).

2,5 mg

# BORTEZOMIB ADAMED



