


BORTEZOMIB ADAMED 2,5 mg

Przygotowanie roztworu do wstrzyknięcia podskórnego i dożylnego



Objętość rozpuszczalnika wykorzystywana do przygotowania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i podskórnych różni się. **Z tego względu otrzymane docelowe stężenie roztworu będzie różne.**

Ponieważ BORTEZOMIB ADAMED jest produktem cytotoksycznym podczas obchodzenia się z lekiem i przygotowania do użycia należy zachować ostrożność. **By chronić się przed kontaktem leku ze skórą zaleca się stosowanie rękawiczek i innego rodzaju odzieży ochronnej.**

Bortezomib Adamed proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań występuje w dawkach 1 mg, 2,5 mg oraz 3,5 mg. Bortezomib Adamed 2,5 mg oraz 3,5 mg można podawać, w zależności od przygotowania, dożylnie albo podskórnie. Nie podawać inną drogą. Podanie dooponowe skutkowało zgonem. Bortezomib Adamed 1 mg podawać WYŁĄCZNIE dożylnie.

Rozpuszczony lek jest pozbawiony konserwantów i powinien zostać zużyty niezwłocznie po przygotowaniu. Jednakże **stabilność chemiczna i fizyczna przygotowanego roztworu zachowana jest do 8 godzin przed podaniem, gdy przechowywany jest w temperaturze 25°C.**

W celu uniknięcia błędu, **strzykawki do podania dożylnego oraz podskórnego powinny zostać oznaczone w różny sposób.**

Lek przeznaczony jest wyłącznie do wstrzykiwania dożylnego bądź podskórnego. Nie podawać inną drogą.

Wszelkie działania niepożądane lub błędy w stosowaniu leku należy zgłaszać do podmiotu odpowiedzialnego lub Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Urząd Rejestracji PL, WM i PB, Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa.
ndl@urpl.gov.pl

