

FINGOLIMOD ADAMED

fingolimod 0,5 mg,
kapsułki, twarde

Karta przypominająca dla pacjentek dotycząca ciąży.

Ważne informacje o leczeniu
lekiem FINGOLIMOD ADAMED
(*fingolimod*)


ADAMED
Dla Rodziny



Przed rozpoczęciem leczenia lekiem FINGOLIMOD ADAMED

- Lek FINGOLIMOD ADAMED (*fingolimod*) jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet w ciąży i kobiet w wieku rozrodczym (w tym nastoletnich dziewcząt) niestosujących skutecznej antykoncepcji.
- Podczas rozpoczynania leczenia, a następnie w regularnych odstępach czasu lekarz prowadzący będzie informował Panią o ryzyku teratogennym i niezbędnych działaniach minimalizujących to ryzyko.
- Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać test ciążowy i uzyskać wynik negatywny, który powinien być zweryfikowany przez lekarza.
- Lekarz poinformuje Panią o potrzebie stosowania skutecznej antykoncepcji podczas leczenia i przez 2 miesiące po jego zakończeniu. Należy porozmawiać z lekarzem o najbardziej skutecznych formach antykoncepcji dostępnych dla Pani.
- Należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania z lekiem FINGOLIMOD ADAMED przekazanej przez lekarza.

Podczas przyjmowania leku FINGOLIMOD ADAMED

- Podczas leczenia pacjentki nie mogą zajść w ciążę.
- Pacjentki muszą stosować skuteczną antykoncepcję podczas przyjmowania leku FINGOLIMOD ADAMED.
- Pacjentki nie mogą zajść w ciążę podczas leczenia i przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia.
- Testy ciążowe należy powtarzać w odpowiednich odstępach czasu.
- Lekarz prowadzący będzie regularnie informował pacjentkę o poważnym ryzyku dla płodu związanym ze stosowaniem leku FINGOLIMOD ADAMED.
- Jeśli zajdzie Pani w ciążę lub jeśli chce Pani zajść w ciążę, należy omówić to z lekarzem, ponieważ leczenie lekiem FINGOLIMOD ADAMED musi zostać przerwane.
- W przypadku ciąży lekarz udzieli Pani informacji.
- Lekarz udzieli Pani porady medycznej dotyczącej szkodliwego wpływu leku FINGOLIMOD ADAMED na płód i przekaze ocenę potencjalnych skutków leczenia.
- Należy wykonać badanie ultrasonograficzne i zakończyć leczenie lekiem FINGOLIMOD ADAMED.
- Lekarz zachęci Panią do zgłoszenia narażenia na lek FINGOLIMOD ADAMED w celu monitorowania wyników ciąży u kobiet narażonych na działanie leku FINGOLIMOD ADAMED podczas ciąży.

Po zakończeniu leczenia lekiem FINGOLIMOD ADAMED

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli uważa Pani, że występujące u Pani SM nasila się (np. występuje osłabienie lub zaburzenia widzenia) lub jeśli zauważy Pani jakiegokolwiek nowe objawy po zakończeniu leczenia lekiem FINGOLIMOD ADAMED z powodu ciąży.

Konieczne jest stosowanie skutecznej antykoncepcji przez 2 miesiące po zakończeniu leczenia lekiem FINGOLIMOD ADAMED z uwagi na czas, jaki jest potrzebny, by lek FINGOLIMOD ADAMED został usunięty z organizmu.

