

Numer telefonu lekarza prowadzącego:

Imię i nazwisko lekarza prowadzącego:

Nazwa ośrodka:

Data pierwszego przepisania teryflunomidu:

Imię i nazwisko pacjenta:

KARTA PACJENTA

Niniejsza Karta Pacjenta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać podczas leczenia lekiem Teriflunomid Adamed. Pełne informacje są zamieszczone w ulotce dla pacjenta, którą można znaleźć na stronie www.adamed.com

Proszę pokazać tę kartę każdemu lekarzowi lub pracownikowi służby zdrowia zajmującemu się Twoją opieką medyczną (np. w nagłym przypadku).

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Obejmuje to wszelkie możliwe działania niepożądane niewymienione w ulotce dla pacjenta. Działania niepożądane można także zgłaszać bezpośrednio za pośrednictwem URPL na stronie internetowej www.smz.ezdrowie.gov.pl. Zgłaszając działania niepożądane, możesz pomóc w uzyskaniu dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa tego leku. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego: Adamed Pharma S.A. +48 22 732 77 00 lub <https://safety.adamed.com.pl>

Materiał zatwierdzony przez URPL 26.06.2024

Istotne działania niepożądane

Lek ten może wpływać na czynność wątroby i niektóre komórki krwi, w tym komórki ważne w zwalczaniu infekcji. Dlatego przed rozpoczęciem leczenia i regularnie w jego trakcie będą wykonywane badania krwi, badania wątroby i mierzone ciśnienie krwi.

Jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych, natychmiast skontaktuj się z lekarzem:

- Skóra lub białka oczu zmieniają kolor na żółty, mocz staje się ciemny, pojawiają się nudności, wymioty, ból brzucha. Możesz mieć problemy z wątrobą.
- Wysoka temperatura, kaszel, dreszcze, obrzęk węzłów chłonnych, zmniejszony lub bolesny odpływ moczu lub splątanie. W takim przypadku możesz mieć infekcję.

Dla pacjentek, w tym dziewcząt i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów

- Nie rozpoczynaj stosowania teryflunomidu, jeśli jesteś w ciąży lub podejrzewasz, że możesz być w ciąży. Lekarz może poprosić Cię o wykonanie testu ciążowego.
- Należy stosować skuteczną antykoncepcję podczas stosowania teryflunomidu i po jego zakończeniu.
- Twój lekarz udzieli porady na temat potencjalnych zagrożeń dla nienarodzonego dziecka i potrzeby stosowania skutecznej antykoncepcji.
- Jeśli chcesz zmienić metodę antykoncepcji lub planujesz zająć w ciążę, skontaktuj się ze swoim lekarzem.
- **Jeżeli zajdziesz w ciążę lub podejrzewasz, że jesteś w ciąży, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.**
- W przypadku ciąży lekarz może zalecić stosowanie innych leków, aby przyspieszyć usuwanie teryflunomidu z organizmu.
- Powinnaś także porozmawiać ze swoim lekarzem, jeśli planujesz karmić piersią lub karmisz piersią.
- Ty lub Twoi rodzice/opiekunowie powinniście skontaktować się z lekarzem natychmiast po rozpoczęciu miesiączki podczas stosowania teryflunomidu. Lekarz udzieli porady na temat potencjalnego ryzyka stosowania teryflunomidu dla nienarodzonego dziecka i omówi rozpoczęcie stosowania skutecznej antykoncepcji.

Zapisz poniżej następujące dane:

Data pierwszej recepty: _____ Dane kontaktowe lekarza: _____