

KARTA OSTRZEŻEŃ DLA PACJENTA

APIXABAN
ADAMED
(apiksaban)

Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta

Należy zawsze mieć tę kartę przy sobie.

Należy pokazać tę kartę farmaceucie, dentyście i innym osobom należącym do fachowego personelu medycznego, którzy leczą pacjentów.

Leczę się przeciwzakrzepowo z zastosowaniem leku Apixaban Adamed (apiksaban) w celu zapobiegania powstaniu zakrzepów krwi.

Informacja dla pacjentów

- Lek Apixaban Adamed należy przyjmować regularnie, zgodnie z zaleceniami. W przypadku pominięcia porannej dawki należy przyjąć ją od razu, jak tylko pacjent sobie o tym przypomniał i można ją przyjąć jednocześnie z dwoma wieczornymi. Pominiętą dawkę wieczorną można przyjąć wyłącznie tego samego wieczoru. Nie należy przyjmować dwóch dawek następnego dnia rano, zamiast tego należy kontynuować przyjmowanie leku następnego dnia zgodnie z zaleceniami, dwa razy na dobę.
- Nie należy przerywać stosowania leku Apixaban

Adamed bez konsultacji z lekarzem, ze względu na ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub innych powikłań.

- Apixaban Adamed pomaga w rozrzedzaniu krwi. Jednakże może to zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia.
- Objawy przedmiotowe i podmiotowe krwawień obejmują zasinienie lub wykwie podskórny, smoliste stolce, krew w moczu, krwawienie z nosa, zawroty głowy, zmęczenie, bledłość lub osłabienie, nagły, silny ból głowy, odrzucanie krwi lub krwawe wymioty.
- Jeśli krwawienie nie ustępuje samoczynnie, **należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.**
- W przypadku konieczności poddania się zabiegowi chirurgicznemu lub jakimkolwiek zabiegowi inwazyjnemu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Apixaban Adamed.

Informacja dla osób należących do fachowego personelu medycznego

- Apixaban Adamed (apiksaban) jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym działającym poprzez bezpośrednie, selektywne hamowanie czynnika Xa.
- Apixaban Adamed może zwiększać ryzyko krwawienia. W przypadku wystąpienia poważnego krwawienia, należy niezwłocznie przerwać leczenie.
- Leczenie lekiem Apixaban Adamed nie wymaga rutynowej kontroli ekspozycji na lek. Kalibrowany, ilościowy test anty-Xa może być użyteczny w wyjątkowych sytuacjach np. przedawkowanie

- oraz nagły zabieg chirurgiczny [nie jest zalecane oznaczanie czasu protrombinowego (PT), międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) oraz czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT)] – patrz ChPL.
- Dostępny jest lek odwracający działanie apiksabanu skierowane przeciw czynnikowi Xa.

Należy uzupełnić ten punkt samodzielnie lub zwrócić się do lekarza z prośbą o uzupełnienie.

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Wskazanie:

Dawka: mg dwa razy na dobę

Imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu lekarza:

KARTA OSTRZEŻEŃ DLA PACJENTA

[dzieci i młodzież]

APIXABAN
ADAMED
(apiksaban)

(apiksaban)

Karta Ostrzeżeń dla Pacjenta

**Dziecko lub jego opiekun powinni mieć tę kartę
zawsze przy sobie.**

Przed leczeniem należy pokazać tę kartę farmaceutce, dentyście i innym osobom związanym z ochroną zdrowia.

Leczę się przeciwzakrzepowo lekiem Apixaban Adamed (apiksabanem) w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi.

Informacja dla pacjentów/opiekunów

- Lek Apixaban Adamed należy przyjmować/podawać regularnie, zgodnie z zaleceniami. W przypadku pominięcia dawki porannej należy przyjąć/podać ją od razu, jak tylko pacjent/opiekun sobie o tym przypomniał i można ją przyjąć/podać jednocześnie z dawką wieczorną. Pominiętą dawkę wieczorną można przyjąć/podać wyłącznie tego samego wieczoru. Nie należy przyjmować/podawać dwóch dawek następnego dnia rano, zamiast tego należy

kontynuować przyjmowanie/podawanie leku
następnego dnia zgodnie z zaleceniami, dwa razy na
dobę.

- Nie należy przerywać przyjmowania/podawania leku Apixaban Adamed bez konsultacji z lekarzem, ze względu na ryzyko zakrzepu krwi lub innych powikłań.
- Lek Apixaban Adamed pomaga w rozrzedzaniu krwi, może to jednak zwiększać ryzyko krwawienia.
- Objawy przedmiotowe i podmiotowe krwawień obejmują zasinienie lub wylew podskórny, smoliste stolce, krew w moczu, krwawienie z nosa, nagły głowy, zmęczenie, bladeść lub osłabienie, zawroty i silny ból głowy, odrzuczanie krwi lub krwawe wymioty.
- Jeśli krwawienie nie ustąpi samoczynnie, należy **niewłotwie skończyć** poddania się zabiegowi chirurgicznemu lub jakimkolwiek zabiegowi inwazyjnemu należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Apixaban Adamed.

Informacja dla osób należących do fachowego personelu medycznego

- Apixaban Adamed (apiksaban) jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym działającym przez bezpośrednie, selektywne hamowanie czynnika Xa.
- Lek Apixaban Adamed może zwiększać ryzyko krwawienia. W przypadku poważnego krwawienia należy niezwłocznie przerwać leczenie.
- Stosowanie leku Apixaban Adamed nie wymaga rutynowej kontroli ekspozycji na lek.

Skalibrowany, ilościowy test anty-Xa może być przydatny w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w razie przedawkowania lub nagłego zabiegu chirurgicznego [nie zaleca się oznaczania czasu protrombinowego (PT)], międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) ani czasu czynnika trombolastyny po aktywacji (aPTT)] – patrz CHPL.

Dla osób dorosłych dostępny jest lek odwracający działanie apikabanu skierowane przeciw czynnikom Xa, jednakże nie ustalono jego bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i młodzieży (patrz charakterystyka produktów leczniczych dla adnaksanetu alfa).

Imię i nazwisko:

Data urodzenia

Wskazanie:

Masa ciała:

Dawka: mg dwa razy na dobę

Imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu lekarza:

