



KARTA DLA PACJENTA

Erimox

(apiksaban)

Należy zawsze mieć tę kartę przy sobie/dziecku/opiekunie.

Przed rozpoczęciem leczenia należy pokazać tę kartę farmaceucie, dentyście i innym osobom należącym do fachowego personelu medycznego, którzy leczą pacjentów.

Leczę się przeciwzakrzepowo z zastosowaniem leku Erimox (apiksaban) w celu zapobiegania powstaniu zakrzepów krwi.

Informacja dla pacjentów/opiekunów

- Lek Erimox należy przyjmować regularnie, zgodnie z zaleceniami. W przypadku pominięcia porannej dawki należy przyjąć ją od razu, jak tylko pacjent sobie o tym przypomni i można ją przyjąć jednocześnie z dawką

wieczorną. Pominiętą dawkę wieczorną można przyjąć wyłącznie tego samego wieczoru. Nie należy przyjmować dwóch dawek następnego dnia rano, zamiast tego należy kontynuować przyjmowanie leku następnego dnia zgodnie z zaleceniami, dwa razy na dobę.

- Nie należy przerywać stosowania leku Erimox bez konsultacji z lekarzem, ze względu na ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub innych powikłań.
- Erimox pomaga w rozrzedzaniu krwi. Jednakże może to zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawienia.
- Objawy przedmiotowe i podmiotowe krwawień w tym zasinienie lub wylew podskórny, smoliste stolce, krew w moczu, krwawienie z nosa, zawroty głowy, zmęczenie, błądź lub osłabienie, nagły, silny ból głowy, odkrztuszanie krwi lub krwawe wymioty.
- Jeśli krwawienie nie ustępuje samoczynnie, **należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.**
- W przypadku konieczności poddania się zabiegowi chirurgicznemu lub jakiegokolwiek zabiegowi inwazyjnemu, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Erimox.

{MMM RRRR}

Informacja dla osób należących do fachowego personelu medycznego

- Erimox (apiksaban) jest doustnym lekiem przeciwzakrzepowym działającym poprzez bezpośrednie, selektywne hamowanie czynnika Xa.
- Erimox może zwiększać ryzyko krwawienia. W przypadku wystąpienia poważnego krwawienia, należy niezwłocznie przerwać leczenie.
- Leczenie lekiem Erimox nie wymaga rutynowej kontroli ekspozycji na lek. Kalibrowany, ilościowy test anty-Xa może być użyteczny w wyjątkowych sytuacjach np. przedawkowanie oraz nagły zabieg chirurgiczny [nie jest zalecane oznaczanie czasu protrombinowego (PT), międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR) oraz czasu częściowej trombolastyny po aktywacji (aPTT)] – patrz ChPL.
- Dostępny jest lek odwracający działanie apiksabanu skierowane przeciw czynnikowi Xa. U dorosłych nie potwierdzono jednak jego bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego andeksanetu alfa).

Należy uzupełnić ten punkt lub zwrócić się do lekarza z prośbą o uzupełnienie

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Wskazanie:

Waga:

Dawka:

mg dwa razy na dobę

Imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu lekarza: