



Broszura dla pacjenta

Przeczytaj broszurę i zapoznaj się z ulotką przed rozpoczęciem stosowania leku. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Ten lek zawiera metamizol. Aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych, stosuj go zgodnie z zaleceniami.

Jak prawidłowo stosować lek?

Nie stosuj leku dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli objawy nie ustępują lub nasilają się - skontaktuj się z lekarzem.

Co powinieneś wiedzieć?

Metamizol może powodować agranulocytozę, czyli znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek.

Jest to rzadkie, ale poważne działanie niepożądane, które może prowadzić do ciężkich i zagrażających życiu zakażeń.

Agranulocytoza może wystąpić w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu - także u osób, które wcześniej stosowały metamizol bez powikłań.

Objawy alarmowe sugerujące agranulocytozę:

- gorączka, dreszcze
- ból gardła
- bolesne owrzodzenia nosa, jamy ustnej, gardła, okolicy narządów płciowych lub odbytu.

Co zrobić w przypadku objawów alarmowych?

Natychmiast przerwij stosowanie leku i skontaktuj się z lekarzem.

Uwaga: Jeśli przyjmujesz metamizol z powodu gorączki, możesz trudniej zauważyć, że jest to objaw agranulocytozy.

Może być on także maskowany podczas stosowania metamizolu równocześnie z antybiotykami.

Gdzie szukać informacji: Szczegółowe informacje (dawkowanie, interakcje, przeciwwskazania) znajdują się w ulotce.

Pamiętaj! Broszurę należy przechowywać w bezpieczny sposób, aby zawsze wiedzieć, jak należy postępować.

2.0/MET/05.2026